

ගොයලේ තෙතු හා පළුල් තතු කාර්බකට් මරදානයට

නොමිනි

(බිස්පිරිබැක් සේවීයම් 100 ග්‍රෑම් / ලී. විස්. සී.)

උතු ඔබගේ කුහුරේ ව්‍යක්තියට අනුව
තොරාගෙ හැකි
නව ඇකුරුම් තුමානුවලින්



නොමිනි නව නිර්දේශය

16 L වැංකියකට

20 ml ඩී

අක්කරයකට (16L වැංකි x 10)

200 ml ඩී


ROP/L/141020

- කාර්බක ප්‍රතිච්‍රිත සඳහා සාම විවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිඵලීය පාලන තුම අනුගමනය කරන්න.
- ප්‍රතිඵලීය ප්‍රතිඵලීය ප්‍රතිඵලීය ප්‍රතිඵලීය ප්‍රතිඵලීය ප්‍රතිඵලීය ප්‍රතිඵලීය.
- හාටිගෙටේ පෙර ලේඛිලෝය ඇති උපදෙස් නොදින තියෙන්න.



ගොවියාගේ නිතම්මිතරා ලංකේම්

සාර්ථක ප්‍රතිඵල සඳහා



නොමිනි 20ml හා
ප්‍රතිඵලටත් 20ml ක
16L අත් ඉසීන
විඛියකට ගෙවූ
මිශ්‍රණය සාදා ගන්න.



පැල සිටුවා නො වපුරා
දින 8ත - 14ත අතර
(වල පැලෙන් නොදැනු
මතු වූ පසු) මියදුලෙනි
ප්‍රමාද කහ පැර නොමිනි
බිස්පයිරිබැක සේඛියම්
ඉසින්ත, වල්තායකය
ඉසින් වට් පසෙන්
තෙනමතය නොදැනු
තිබා යුතුයි.



සස්ම විටම අකකරයෙට
මිටර 16 වැංකි 10 ක
ගෙවුන්න.
(සේඛියකට වැංකි 25)



නොමිනි බිස්පයිරිබැක
සේඛියම් ගෙවූ දින 2කට
පසු වතුර බැඳු තබන්න.

නොමිනි බිස්පයිරිබැක් සේඛියම් සතු විශේෂීත ලක්ෂණ

- ✓ ගොයලේ තත්ත්ව හා පළුල් පත්‍ර සාර්ථකව මරදුනය කරයි.
- ✓ නිරදේශීත මාත්‍රාව යෙදීමෙන් ගොයල කහ පැහැවීමක නො පිළිස්සීමක සිදු නොවේ.
- ✓ නොමිනි බිස්පයිරිබැක සේඛියම් ඉකම්තිනම වලු පැළෙශේ වලට උරා ගනී
- ✓ නියමිත මාත්‍රාව යෙදීමෙට පහසුවන පරිදි මිටර 16, අකකර 1/2 කහ
අකකර 1 නිරදේශීත ආසුරුදීමෙමුන් ලබාගත හැක.
- ✓ ජනාතයේ කුම්කාද සමාගම විසින් නිෂ්පාදිත නොමිනි, ලංකෝම් නිවසින
බඩ වෙත වශවාසයෙන් යුතුව ගෙන එකි

ගොවියාගේ හිතමිතුරා ලංකෝම්

நெற்பயிரில் காணப்படும் புற்களையும் அகன்ற இலைக் களைகளையும் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு

நொமினி

(பிஸ்பைரி பக் சோடியம் 100 கிராம்/லீ எஸ் சி)

தற்போது உங்கள் வயலின் இப்பற்பிற்கு
ஏற்ப, தெரிவு செய்யக் கூடிய வகையில்
புதிய அளவுப் பொதிகளில்



புதிய சிபாரிசுகள் மீண்டும்

16 லீற்றர் தாங்கிக்கு

20 மீ.லி.

ஏக்கருக்கு (16-10 தாங்கி)

200 மீ.லி.

ROP/L/141020

- வெற்றிகரமான பெறுபேறுகளுக்கு எப்போதும் ஒன்றிணைந்த பீடைக் கட்டுப்பாடு முறைகளைப் பின்பற்றுகின்கள்.
- பீடை நாளிகள் முழுதானவை. பாதுகாப்பாகக் கையாளுங்கள்.
- பாலிப்பதற்கு முன் லேவலில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களை நன்றாக வாசியுங்கள்.



லங்கெம் விவசாயிகளின் தோழன்

சிறந்த பயணைப் பெற



நோமினி 20ml மற்றும் சேர்பக்டன்ட் 20ml ஜ் 16லீற்றர் கையால் தெளிக்கும் தாங்கியில் இட்டு கலவையைத் தயாரித்துக் கொள்ளுக்கள்



விதைத்து அல்லது நாற்று நட்டு 08-14 நாட்களுக்கு (களைகள் நன்றாக வெளித் தோண்டிய பின்னர்) வயலில் உள்ள நீரை அகற்றி விட்டு நோமினி பிஸ்பைரிபக் சோடியத்தை தொழிழ்கள். கணா நாசினிலைத் தெளிக்கும் போது நிலத்தில் நன்றாக ஈரவிப்பு இருக்க வேண்டும்.



எப்போதும் ஏக்கருக்கு 10 16 லீற்றர் தாங்கிகளை விசிறவும்.
(ஹெக்டரிற்கு 25 தாங்கிகள்)



நோமினி பிஸ்பைரிபக் சோடியம் பாவிக்கப்பட்ட 2 நாட்களின் பின் நீரைத் தேக்கவும்.

நோமினி பிஸ்பைரிபக் சோடியத்தின் விசேட பண்புகள்

- ✓ நெற்பயிரில் காணப்படும் புற்களையும் அகன்ற இலைக் களைகளையும் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தும்.
- ✓ சிபாரிசு செய்யப்பட்ட அளவினைப் பாவிக்கும் போது நெற்பயிர் மஞ்சள் நிறமாகவோ வெளிறவோ மாட்டாது.
- ✓ நோமினி பிஸ்பைரிபக்க் சோடியம் களைகளினால் விரைவாக அகத்துறிஞ்சப்படுவதால் மழுக் காலங்களிலும் சிறப்பாகச் செயற்படும்.
- ✓ சிபாரிசு செய்யப்பட்ட அளவில் பாவிக்கப்படுவதை இலகுவாக்குவதற்காக 1/2 ஏக்கருக்கு, 1 ஏக்கருக்கு என உரிய பொதிகளில் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது.
- ✓ ஜப்பானின் குழியாய் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்படும் நோமினி, வங்கெம் நிறுவனத்தின் நம்பிக்கையுடன் விநியோகிக்கப்படுகின்றது.

லங்கெம் விவசாயிகளின் தோழுன்