



කැබ්රියෝ ටොප්

පයිරක්ලොස්ට්‍රොබින් 5% + මෙටිරාම් 55% (බර අනුව) ඩබ්. ජී

භාවිතය සඳහා නිර්දේශයන්

භාවිතය සඳහා උපදෙස්

බෝගය	පාලනය වන රෝග	ජලය ලී. 10 ක දිය කලයුතු ප්‍රමාණය	මාත්‍රාව
ලොකු එළඹු / රතු එළඹු	ඇන්ත්‍රැක්නොස් හා දම් පුළුලි රෝගය	ග්‍රෑම් 20	ග්‍රෑම් 640 - 800
මිරිස්, බෝංචි, තක්කාලි, මාළු මිරිස්, ලික්ස්, බටු, අඹ, කෙසෙල්	ඇන්ත්‍රැක්නොස්	ග්‍රෑම් 20	පළමු අවධිය ග්‍රෑම් 640 - 800
කරවිල, පිපිඤ්ඤ, පතෝල, වැටකොළ, වට්ටකකා, කුකුඛිට්ටි කුලයේ බෝග	පීචි පුස් රෝගය ශචි පුස් රෝගය		දෙවන අවධිය ග්‍රෑම් 1000 - 1200
අරතාපල් සහ තක්කාලි	පශ්චිම අංගමාරය පූර්ව අංගමාරය		තෙවන අවධිය ග්‍රෑම් 1400 - 1600

පෙර අස්වනු කාලය - දින 14 යි.



- 1

පුළුල් පරාසයක ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුත් ආරක්ෂාරී හා රෝග නිවාරණ ගුණයෙන් යුත් ස්පර්ශ සහ සංස්ථානික දිලීරනාශකයකි.
- 2

ජලයේ තෙත් කළ හැකි කැටි ආකාර සංයෝගයකි.
- 3

පතු සෛල හරහා ගමන් කරන බැවින් වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස රෝග මර්දනයවේ.



ගොවියාගේ හිත මිතුරා

නො. 98, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10. දුර ක: 011 776 6000

භාවිතයට පෙර ලේබලයේ උපදෙස් හොඳින් කියවන්න.
භාවිතයේදී එම උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න.