

# රේගන්ට් ෆිප්රොනිල්

ෆිප්රොනිල් 50 ග්‍රෑම් / ලී එස්. සී

- ★ පුළුල් පරාසයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් යුත් ෆීනයිල් පයිරොසෝල් කාණ්ඩයට අයත් කෘමිනාශකයකි.
- ★ සංස්ථානික, ස්පර්ශීය හා ආමාශගත විෂ ලෙස ක්‍රියා කරයි

එකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම තුළින් කෘමිනාශක භාවිතය අවම කර ගන්න.

**වී**

වගාවේ



දඹුරු පැළ කිඩාවන්




කොළ හකුලන දළඹුවන්



පැළ මැකකන්

**මිරිස්**

වගාවේ



පැළ මැකකන්



කුඩිත්තන්



සුදු මැස්සන්

**අල**

වගාවේ



පැළ මැකකන්

**ඵෑණු**

වගාවේ



පැළ මැකකන්

**වීසිතුරු මල් / ශාක** වගාවේ



පැළ මැකකන්



කොරපොතු කෘමීන්



ගස් විදින්නන්



පිටි මකුණන්



**මර්දනයට**



සී/ස ලංකෙමී ලංකා පොදු සමාගම  
98, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10. දුරකථන: 011 776 6000

# රෙගන්ට් ෆිෂරොනිල්

ෆිෂරොනිල් 50 ග්‍රෑම් / ලී එස්. සී

භාවිතය සඳහා නිර්දේශයන්		භාවිතයට උපදෙස්	
බෝගය	මර්දනය වන කෘමීන්	ජලය ලීටර් 10 ක දිය කල යුතු ප්‍රමාණය (මි. ලී)	නිෂ්පාදිතය යෙදීම (මිලි ලීටර් / හෙක්ටයාරයකට)
වී	පැළ මැක්කන්	5	160 - 200
	කොළ හඳුනන දළඹුවන්	12	384 - 480
	දඹුරු පැළ කීඩුවන්	15	480 - 600
මිරිස්	පැළ මැක්කන්, කුඩිත්තන් හා සුදු මැස්සන්	10	පෙර වර්ධන අවධිය 320 - 400
අර්තාපල්	පැළ මැක්කන්		පසු වර්ධන අවධිය 500 - 600
එළඹු	පැළ මැක්කන්	10	320 - 400
වීසිතුරු මල් පැල සහ වීසිතුරු පත්‍රික ශාකවල	පැළ මැක්කන් කොර පොතු කෘමීන් සහ පිරි මකුණන්	10	භාහිර දුක්තට ඇති පත්‍රවල උඩ සහ යටට හොදින් වදිනසේ කෘමිනාශනය ඉගින්න.
	පුරුක් පණුවන් සහ ගස් විදින්නන්	10 - 20	

## සැලකිය යුතුයි

පෙර අස්වනු කාලය දින 14.

වී වගාවේ කෘමි භාහිර ඇතිවීමට රෙගන්ට් යොදන්න. දඹුරු පැළ කීඩුවන් මර්දනය සඳහා ගොයමේ පාමුලට වදිනසේ යොදන්න.



එළඹු සඳහා අවශ්‍ය නම් පමණක් දින 10 ක කාල පරතර වලින් නැවත යොදන්න.



මිරිස් වගාවේ කොළ කොඩිවීමට හේතුකාරක වන පැළ මැක්කන්, කුඩිත්තන් හා සුදු මැස්සන් මර්දනය සඳහා මිරිස් තවනට යොදන්න.

පැළ සිටීමෙන් පසු භාහිර දුක්තට ලැබේ නම් දින 10-14 කාල පරතර වලින් නැවත යොදන්න.



මෙම කේතය සහිත කෘමිනාශක ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා අඩන්ඩිව යෙදීමෙන් වලකින්න.

ගොවිභාගේ හිත මිතුරා

98, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10. දුරකථන: 011 776 6000



භාවිතයට පෙර ලේබලයේ උපදෙස් හොදින් කියවන්න, භාවිතයේදී එම උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න.